



Difenhidramina para uso tópico

Otros nombres: Benadryl®, Caladryl®, etc.

¿POR QUÉ se indica este medicamento?

La difenhidramina es un antihistamínico que se utiliza para aliviar el prurito (pica-zón) de las picaduras de insectos, quemaduras del sol, picaduras de abejas, hiedras venenosas o irritaciones cutáneas secundarias.

¿CUÁNDO debe usarse?

La difenhidramina para uso tópico se vende sin necesidad de receta médica. Se utiliza tres o cuatro veces al día. Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta y en la caja y pídale al farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.

Durante un período de 24 horas no aplique este medicamento con más frecuencia ni en dosis más grandes de lo que se le indica en la etiqueta.

¿CÓMO se utiliza?

La difenhidramina para uso tópico se presenta en forma de pomada, loción, gel y aerosol para aplicación sobre la piel.

Lave delicadamente la zona afectada y aplique una capa delgada de difenhidramina. Luego, lávese las manos de manera que la erupción no se contagie a otras zonas del cuerpo. Evite el contacto del medicamento con las membranas mucosas, como los ojos, la boca, la nariz, la vagina y el recto.

¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este medicamento?

Si la erupción de la piel se pone peor o persiste por más de siete días, suspenda el uso de la difenhidramina y consulte a su médico.

Tenga cuidado cuando aplique cosméticos y otros preparados para la piel en las zonas tratadas.

¿Qué hago SI OLVIDO aplicar una dosis?

Aplique la dosis faltante en cuanto se acuerde y las dosis restantes del día a intervalos regulares. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita la dosis faltante. No aplique una dosis doble.

¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? Qué puedo hacer al respecto?

Erupción cutánea, quemaduras solares, mayor sensibilidad a las lámparas solares y a la luz del sol. Consulte a su médico.

¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?


Las mujeres embarazadas o que están amamantando no deben utilizar este medicamento.

No aplique difenhidramina cuando hay varicela o sarampión y no la utilice para niños menores de dos años de edad, a menos que se lo indique expresamente un médico.

La difenhidramina en forma de aerosol es inflamable. No exponga el recipiente a llama o cigarrillo encendido.

¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien tapado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente. La forma en aerosol es inflamable. Mantenga el recipiente alejado de llamas o de fuentes de calor intenso.



SELLO FARMACIA

"Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico"

Realizado por



Ministerio
de Salud
PRESIDENCIA
DE LA NACION

