



# Omeprazol

Otros nombres: Gastec®, Omeprasec®, Procelac® y Ulcozol®

## ¿POR QUÉ se indica este medicamento?

El omeprazol reduce la cantidad de ácido que se produce en el estómago. Se utiliza para evitar la recurrencia de úlceras y para tratar otras afecciones en las cuales el estómago produce demasiado ácido.

## ¿CUÁNDO debe tomarse?

El omeprazol generalmente se toma una vez al día, antes de una comida. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.

## ¿CÓMO se utiliza?

El omeprazol se presenta en forma de cápsulas de liberación controlada (de acción prolongada). En la etiqueta se le indica la cantidad que debe tomar con cada dosis. No abra, no triture ni mastique las cápsulas. Tráguelas enteras. Consulte a su farmacéutico si tiene dudas sobre la repetición de la receta.

## ¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este medicamento?

No falte a ninguna cita con su médico para que se pueda evaluar su reacción al medicamento. No fume mientras está tomando omeprazol. Fumar puede reducir su eficacia.

## ¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?

Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita la dosis faltante. No tome una dosis doble.

## ¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?

Aunque no es común que el omeprazol produzca efectos secundarios, algunas ve-

ces pueden presentarse.

Dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, náusea, vómito, dolores abdominales, tos, síntomas de resfrío, mareo, salpullido. Si estos efectos son persistentes o graves, consulte a su médico.

## ¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?

Antes de tomar omeprazol. Informe a su médico si está embarazada o amamantando.

Antes de tomar omeprazol, informe a su médico y al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, en especial el diazepam (Valium), warfarina (Coumadin), fenitoína (Dilantin), cetoconazol, ampicilina y hierro.

Antes de tomar omeprazol informe a su médico si sufre alguna enfermedad en el hígado.

No deje que ninguna otra persona tome su medicamento.

## ¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien tapado y fuera del alcance de los niños.

Guárdelo a temperatura ambiente, alejado del calor y la luz.



SELLO FARMACIA

"Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico"

Realizado por



Ministerio  
de Salud  
PRESIDENCIA  
DE LA NACION

