



Piridoxina (Vitamina B6)

Otros nombres: Benadon®, Piridoxina Austral® y Tanvimil B6®.

¿POR QUÉ se indica este medicamento?

La piridoxina o vitamina B6 es necesaria en el organismo para la utilización de la energía en los alimentos que se consumen, la producción de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado de los nervios. Se utiliza para tratar y prevenir la deficiencia de vitamina B6 debido a una mala alimentación, ciertos medicamentos y ciertas afecciones médicas.

¿CUÁNDO debe tomarse?

La piridoxina generalmente se toma una vez al día. Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.

¿CÓMO se utiliza?

La piridoxina se presenta en forma de tabletas regulares y de liberación controlada (de acción prolongada). En la etiqueta se le indica la cantidad que debe tomar con cada dosis.

No mastique, no triture ni corte las tabletas de liberación controlada. Se deben tragar enteras.

¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este medicamento?

Si tiene que tomar piridoxina con algún otro medicamento, no suspenda el uso de ninguno de ellos hasta que se lo indique su médico.

Asegúrese de tener siempre suficiente medicamento a la mano. Verifique su provisión antes de salir de vacaciones, antes de días feriados u otras ocasiones en que le sea imposible conseguirlo.

¿Qué DIETA especial debo seguir mientras uso este medicamento?

Posiblemente el médico o el farmacéutico le

recomendarán ingerir más alimentos que contengan vitamina B6, especialmente cereales integrales, pescado, verduras, leguminosas, hígado y otras vísceras.

¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?

Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde y continúe con su horario normal.

¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?

Aunque no es común que la piridoxina produzca efectos secundarios, algunas veces pueden presentarse.


Náusea, dolor de cabeza, falta de sueño, cosquilleo, picazón, ardor o sensación de tirantez. Si estos efectos son graves, consulte a su médico.

¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?

Antes de tomar piridoxina, informe a su médico y al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, en especial la levodopa.

¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien tapado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente, alejado de la luz.



SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”

Realizado por



Ministerio de Salud
PRESIDENCIA DE LA NACION

